ОТРАСЛЕВАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ГАЗПРОМ

Использовать только эту сторону листа, обратная сторона не проверяется!

ШИФР 3 4 2 4 6

Класс 11 Вариант 1 Дата Олимпиады 02.03.19

Площадка написания МГТУ им. Баумана

Задача	1	2	3	4	5	6	Σ Цифрой	Σ Прописью	Подпись
Оценка	10	8	0	9	20	8	55	пятьдесят пять	

№5

C++

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main{
int x,y;
cin>>x >>y;
if ((x>=19)||(x<(5*y))){
 Cout<<"точка попала в область";
 {
else{
 Cout<<"точка не попала в область";
 {
return 0;
{
```

Выражение будет истино при любом A, если при $(X<19)^{(1)}$ и $(X\geq 5y)^{(2)}$, выражение $xy<2A$ будет истино, т.е. наибольшее x и y соответствующие условиям (1) и (2) это $x=18$ и $y=3$. Значит, $18\cdot 3<2A$, т.е. $A>27$. $A=28$.

Ответ: 28.

ГАЗПРОМ ОТРАСЛЕВАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ

Использовать только эту сторону листа, обратная сторона не проверяется!

ШИФР 3 4 2 4 6

№6

$xyz+*yz*x+-zz*xy-*+$

$(z+y)*x$; $(z*y)+x$

$(z*y)+x-(z+y)*x$; $z*z$; $(y-x)*z*z$

$(z*y)+x-(z+y)*x+(y-x)z^2$ неверно.

~~$xzx+yx-xz-yx$~~

Осталось подставить $x=20_{-3}$, $y=1202_{-3}$, $z=110_{-3}$

$x=20_{-3}=2\cdot(-3)^1=-6$ +

$y=1202_{-3}=1\cdot(-3)^3+2\cdot 9+2=-27+18+2=-7$ +

$z=110_{-3}=1\cdot(-3)^2-3=0$ –

Получим, $-6-(-7)\cdot(-6)+(-7\div(-6))\cdot 0=$

$=-6-12=-48_{10}$

Переведём число -48_{10} в 16-ую СС:

48	16
-48	3
0	

$48_{10}=30_{16}$

Ответ: -30_{16}. –

ГАЗПРОМ ОТРАСЛЕВАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ

Использовать только эту сторону листа, обратная сторона не проверяется!

ШИФР 3 4 2 4 6

№4

2) Пусть молодой человек сначала выбрал 5 цветов вида „GD". Всего цветов вида „GD" было 9, т.е. из 9 цветов он выбрал 5, сравнив их все попарно. Всего таких пар 36. Значит, на выбор 5 цветов из вида „GD" он затратил 36·5 секунд. Затем, он каждый цветок вида „DD" сравнил с ~~выбранными, это еще 7·5·5 секунд.~~ Значит, человек затратил другим цветком вида „DD" (отдельно рассмотрим последующий случай) и ~~потратил~~ еще $7 \cdot 6 \cdot 5/2 = 21 \cdot 5$ секунд. Осталось сравнить цветы двух видов, это еще 9·7·5 секунд. Всего он потратил $(36 + 21 + 63) \cdot 5$ секунд $= 120 \cdot 5$ секунд $= 10$ минут.

1) Если человек выбрал 0 цветов вида „DD", то всего 1 вариант комбинаций цветов в букете.

если 1 цветов вида „DD", то всего 7 вариантов $\left(\frac{7!}{6!1!}\right)$

2 цв. — $\frac{7 \cdot 6}{2} = 21$ вариант $\left(\frac{7!}{5!2!}\right)$

3 цв. — $\frac{7!}{4!3!} \cdot \frac{9!}{6!3!}$ вариантов

4 цв. — $\frac{7!}{3!4!} \cdot \frac{9!}{5!4!}$ вариантов

5 цв. — $\frac{7!}{2!5!} \cdot \frac{5!}{4!5!}$ вариантов

6 цв. — $\frac{7!}{1!6!} \cdot \frac{5!}{3!2!}$ вариантов

7 цв. — $1 \cdot \frac{9!}{2!7!}$ вариантов

$C_7^1 \cdot C_9^5$ - ответ

Т.к. нам надо выбрать n цветов вида „DD" и убрать n цветов вида „GD"

ГАЗПРОМ ОТРАСЛЕВАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ

Использовать только эту сторону листа, обратная сторона не проверяется!

ШИФР 3 4 2 4 6

Получаем $1 + 63 + \frac{7!}{5!2!} \cdot \frac{9!}{7!\cdot 2!} + \frac{7!\cdot 8!}{4!3!\cdot 6!\cdot 3!} + \frac{7!8!}{3!4!\cdot 5!4!} + \frac{7!8!}{2!5!\ 4!5!} + \frac{7!8!}{1!6!\ 3!6!} + \frac{9!}{2!7!}$ вариантов.

Ответ: N вариантов (см. реш.); 1 минута.

№2

Заметим, что только при $x=0, y=1, z=1$; $x=1, y=0, z=0$; $x=1, y=0, z=1$ функция равна единице. Будем переписывать x, y, z так, чтобы эти наборы равнялись единице, т.е. $\bar{x}yz$, $x\bar{y}\bar{z}$, $x\bar{y}z$, если мы их сложим, то получим, $F = \bar{x}yz + x\bar{y}\bar{z} + x\bar{y}z$. Проверим составленную функцию:

x	y	z	$\bar{x}yz$	$x\bar{y}\bar{z}$	$x\bar{y}z$	F
0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0	0
0	1	1	1	0	0	1
1	0	0	0	1	0	1
1	0	1	0	0	1	1
1	1	0	0	0	0	0
1	1	1	0	0	0	0

Ответ: $F = \bar{x}yz + x\bar{y}\bar{z} + x\bar{y}z$. а упростить?

№1

Пусть нам дано число xyz_6, тогда по условию, $xyz_6 = (36x+6y+z)_{10}$, т.е. получаем, что $36x+6y+z = 30(x+y+z)$, тогда

$6x = 24y + 29z$; т.к. $0 \le x \le 5$, то правая часть не превосходит $30z$. Отсюда получим, что $z = 0$, а $x = 4y$. Т.к. в 6-сс $0 < x \le 5$, $0 \le y \le 5$, то $x = 4$, а $y = 1$. Получим, что $41_6 = 150_{10}$. Действительно $150 = 5 \cdot 30$.

Ответ: 150_{10}. +

№3

$$\overline{(x \downarrow y) \mid (\bar{x} \mid z)} \oplus ((\bar{y} \oplus z) \vee (z \to x)) = \overline{x \cdot y + \bar{x} + z} \oplus (\overline{\bar{y} \oplus z} \cdot \overline{\bar{z} + x})$$

$$(\bar{x}y \cdot x \cdot \bar{z}) \oplus (((\bar{y} \oplus z) + (y + \bar{z}))\, z \cdot \bar{x}) = ((\bar{x} + \bar{y}) \cdot x \cdot \bar{z}) \oplus ((\bar{y}z + \bar{y} \cdot \bar{z})\, z \cdot \bar{x})$$

~~$\bar{y} \cdot x \cdot \bar{z} \oplus (\bar{y} \cdot z \cdot x) = (\bar{y} \cdot x \cdot \bar{z} \cdot \bar{y} \cdot z \cdot x) + (\bar{y} \cdot x \cdot \bar{z})$~~

$$\bar{y} \cdot x \cdot \bar{z} \oplus z \cdot y \cdot \bar{x} = \overline{\bar{y} \cdot x \cdot \bar{z} \cdot z \cdot y \cdot \bar{x}} + \bar{y} \cdot x \cdot \bar{z} \cdot \overline{z \cdot y \cdot \bar{x}} =$$

$$= (y + \bar{x} + z)\, z \cdot y \cdot \bar{x} + \bar{y} \cdot x \cdot \bar{z} \cdot (\bar{z} + \bar{y} + x) = z \cdot y \cdot \bar{x} + \bar{y} \cdot x \cdot \bar{z}$$

ошибки в упрощении.

При $x = 1, y = 0, z = 1$ получим

$F = 1 \cdot 0 \cdot 0 + 1 \cdot 1 \cdot 0 = 0$ –

Ответ: 0