ГАЗПРОМ ОТРАСЛЕВАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ

$(ab)c=a(bc)$ $E=mc^2$

Использовать только эту сторону листа, обратная сторона не проверяется!


ШИФР 4 0 6 2 3

Класс 9 **Вариант** 11 **Дата Олимпиады** 09.02.2019

Площадка написания МГТУ им. Н.Э. Баумана

Задача	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Σ Цифрой	Σ Прописью	Подпись
Оценка	5	10	15	~~10~~	10	15					65	шестьдесят пять	

6.



$BE=x$

$BC=\sqrt{3}$

$AB=2$

$\angle AEO = \angle OEC$

$AE=?$

$EC=\sqrt{x^2+3}$

Рассмотрим треугольники AEO и OEC. У них один и тот же угол, а значит их площади относятся как произведения сторон, прилегающих к этому углу.

$$\frac{S_{\triangle OEC}}{S_{\triangle AEO}} = \frac{EC \cdot EO}{AE \cdot EO} \Rightarrow \frac{\frac{2\cdot\sqrt{3}}{2}}{\frac{\sqrt{3}\cdot(x+2)}{2}} = \frac{\sqrt{x^2+3}}{x+2} \Rightarrow \sqrt{x^2+3}=2$$

$x^2+3=4$

$x=1 \Rightarrow AE = AB+x = 2+1 = 3$

Ответ: 3.

Только 1 случай!

15

ОТРАСЛЕВАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ГАЗПРОМ

Использовать только эту сторону листа, обратная сторона не проверяется!

ШИФР Ч | 0 | б | 2 | 3

Чб. Пусть смеси M_0 и X_0 – новые и новую, которые смешали, чтобы всё получить.

$X = \frac{147M}{153}$? Как получили? См. дальше!

$\frac{M_0}{M} = \frac{47}{100}$

$\frac{M_0 + X_0}{M + X} = 37{,}2 \Rightarrow \frac{\frac{47}{100}M + X_0}{M + \frac{147}{153}M} = 37{,}2 \Rightarrow X_0 = 37{,}2 \cdot \frac{124}{153} M - \frac{47}{100} M =$

$\frac{X_0}{X} - ?$

$= M\left(\frac{372 \cdot 30}{153 \cdot 17} - \frac{47}{100}\right) =$

$= M\left(\frac{124000 - 47 \cdot 17}{1700}\right)$

$\frac{X_0}{X} = \frac{124000 - 47 \cdot 17}{\frac{147}{153}} = \frac{123199 \cdot 9}{147 \cdot 100} = 27\frac{2}{51} \approx 27{,}9$

Ответ: 27,9

10

Использовать только эту сторону листа, обратная сторона не проверяется!

ШИФР | Ч | 0 | 6 | 2 | 3 |

5.

$x^2+y^2=(x+5)^2-2xy=(a+1)^2-2a^2+14a-32=$

$=-a^2+16a-31=-(a^2-16a+31)=-((a-8)^2-33)=$

$=-(a-8)^2+33.$

$y=-(a-8)^2+33$ – ограничим сверху функцию, параболу, ветви которой направлены вниз. Наибольшее значение такая функция принимает в своей вершине, а значит при $a=8 \Rightarrow y=33$.

Ответ: $a=8$. ~~8~~ 3 действ. корней? (10)

Ч-а Мальчики девочки все

Дн 33 63 477

Бол 20 151

Без 47 372

М-кол-во мальчиков

Ж-кол-во девочек

M_0-мальчики, которые отвечали, что не прочитали электронные книги

$Ж_0$-девочки, которые ответили тоже самое.

$\frac{M_0+Ж_0}{M+Ж}=\frac{47,7}{100}$; $\frac{M_0}{M}=\frac{33}{100}$ $\frac{Ж_0}{Ж}=\frac{63}{100} \Rightarrow \frac{33M+63Ж}{M+Ж}=47,7 \Rightarrow$

$\Rightarrow 33M+63Ж=47,7M+47,7Ж \Rightarrow 14,3M=15,3Ж \Rightarrow Ж=\frac{143M}{153}$ | всего учащихся $\frac{300}{153}M$

3. $x^4-4x^3+12x^2-24x+24=0$

Мы уже видим, что $x=0$ – не решение, значит я могу делить на x.

Всё уравнение на x^2

$$x^2-4x+12-\frac{24}{x}+\frac{24}{x^2}=0$$

$$(x-2)^2+8-24\left(\frac{x-1}{x^2}\right)=0$$

$$(x-2)^2=24\left(\frac{x-1}{x^2}\right)-8$$

$$(x-2)^2=8\left(\frac{3x-3}{x^2}-\frac{x^2}{x^2}\right)$$

$$(x-2)^2=-8\left(\frac{x^2-3x+3}{x^2}\right)$$

x^2-3x+3

↙ $D<0$ ↘ $a>0$

всегда >0

x^2

↓

всегда >0

$\frac{x^2-3x+3}{x^2}>0$!

↓

$-8\cdot\left(\frac{x^2-3x+3}{x^2}\right)<0.$

$(x-2)^2$

↓

всегда ≥ 0

(15)

ТАКОГО НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!

Ответ: нет

ГАЗПРОМ ОТРАСЛЕВАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ


Использовать только эту сторону листа, обратная сторона не проверяется!

ШИФР 4 0 6 2 3

1. $\sqrt{2013 \cdot 2015 \cdot 2017 \cdot 2019 + 16} = \sqrt{(2016-3)(2016-1)(2016+1)(2016+3)+16} = \sqrt{(2016^2-1)(2016^2-9)+16}$, $a = 2016^2$

$\sqrt{(a-1)(a-9)+16} = \sqrt{a^2-a-9a+9+16} = \sqrt{a^2-10a+25} = \sqrt{(a-5)^2} = a-5$.

Ответ: $2016^2 - 5 = 4064251$. (+)

2. 

Пусть время t, 1 # - это расстояние, которое на часах характеризуется одной минутой, то есть минутная стрелка за час пройдет 60 l, а часовая - 5 l.

5 часов расстояние от часовой до минутной стрелки равно $5 \cdot 5l = 25l$, получаем задачу на догонку.

$V_м = 5l/ч$; $V_ч = 60l/ч$; $S = 25l$.

$t = \frac{S}{V_м - V_ч} = \frac{25l}{55l} = \frac{5}{11}$ часа.

Ответ: $\frac{5}{11}$ часа. (+)

10